

Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Carlos Anwandter



Informe Monitoreo Avifauna

Septiembre 2025

Oficina Provincial Valdivia



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Región de Los Ríos

Oficina Provincial Valdivia



Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter

Equipo:

Gp. Sr. Roberto Rosas Mena
Gp. Sr. Roberto Rosas Peña
Gp. Adm. Sr. Mario Maturana Arévalo
Sr. Patricio Contreras Bravo

Imagen: Totorales a orillas del río Cruces cerca de Punucapa.

Agradecemos a los propietarios de predios particulares por las facilidades otorgadas para el monitoreo.

(Se permite el uso de la información sin fines comerciales mencionando la fuente de origen).

Contenido	
1 Resumen	3
2 Introducción	4
3 Metodología	5
4 Resultados	8
4.1 Cisne de cuello negro (<i>Cygnus melancoryphus</i>)	8
4.1.1 Dentro del Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar	8
4.1.2 Zonas aledañas al Santuario de la Naturaleza –Sitio Ramsar.	9
4.1.3 Abundancia total en el Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar y zonas aledañas.	10
4.2 Taguas (<i>Fulica armillata</i> , <i>F. leucoptera</i> , <i>F. rufifrons</i>)	11
4.3 Huala (<i>Podiceps major</i>)	11
4.4 Picurio (<i>Podilymbus podiceps</i>)	12
4.5 Pimpollo (<i>Rollandia rolland</i>)	12
4.6 Garza boyera (<i>Ardea ibis</i>)	12
4.7 Garza chica (<i>Egretta thula</i>)	13
4.8 Garza cuca (<i>Ardea cocoi</i>)	13
4.9 Garza grande (<i>Ardea alba</i>)	13
Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos	14
4.10 Cormorán yeco (<i>Nannopterum brasilianum</i>)	14
4.11 Zarapito (<i>Numenius phaeopus</i>)	14
4.12 Gaviota cáhuil (<i>Chroicocephalus maculipennis</i>)	14
4.13 Gaviotín piquerito (<i>Sterna trudeaui</i>)	15
4.14 Trile (<i>Agelasticus thilius</i>)	15
4.15 Siete colores (<i>Tachuris rubrigastra</i>)	15
4.16 Pato anteojo (<i>Specularis specularis</i>)	16
4.17 Patos jergones (<i>Anas georgica</i> , <i>A. flavirostris</i>)	16
4.18 Pato real (<i>Mareca sibilatrix</i>)	16
4.19 Pelicano (<i>Pelecanus thagus</i>)	17
4.20 Traro, carancho (<i>Caracara plancus</i>)	17
4.21 Tiuque (<i>Daptrius chimango</i>)	17
5 Anexos	18
Anexo 5.1 Resultados del monitoreo realizado al interior del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, septiembre de 2025.	18
Anexo 5.2 Valores de abundancia mensual cisnes de cuello negro dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza - Sitio Ramsar, período noviembre 2002 – septiembre 2025.	19
Anexo 5.3 Resumen abundancias (nº, %) monitoreo 24 de septiembre de 2025 en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter.	26
Anexo 5.4 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero 2000 – septiembre 2025.	27
Anexo 5.5 Inventario de especies presentes en el SN SR basado en la información disponible en los registros de CONAF y complementado con la base de datos de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Fuente: GBIF.org (20 de abril de 2022) Descarga de ocurrencia de GBIF https://doi.org/10.15468/dl.fpxg9t . RCE = Reglamento Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente.	28

1 Resumen

Durante el monitoreo de avifauna realizado en septiembre de 2025 en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, se registró una abundancia total de 5.757 aves pertenecientes a 31 especies.

Del total contabilizado, el cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*) y la gaviota cáhuil (*Chroicocephalus maculipennis*) destacaron como las especies dominantes, representando en conjunto el 80% de los registros.

Respecto a la distribución espacial, la población de cisnes de cuello negro se concentró mayoritariamente en el sector centro-norte del humedal (Santa María y San Martín). En este periodo se censaron 3.096 individuos de esta especie, de los cuales 2.998 correspondieron a adultos y 98 a polluelos.

2 Introducción

Inserto en el humedal del río Cruces, se encuentra el área bajo protección oficial del Estado de Chile denominada Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (SN), creado por D.S. N° 2.734 del 3 de junio de 1981. Por estar bajo la categoría de protección que se incluye en la Ley 17.288¹ no se permite la extracción de recursos naturales.

Abarca una superficie² de 4.892,22 ha, ubicado en las comunas de Mariquina y Valdivia, Región de los Ríos, sur de Chile (mapa 1). El origen del humedal está en el descenso de los terrenos aledaños a los cursos de agua y su posterior inundación como consecuencia del terremoto de mayo de 1960 que afectó al sur de Chile. El SN SR es importante por la biodiversidad que contiene, más de 20 especies de mamíferos y 119 de aves, la protección que otorga a especies con problemas de conservación (*Lontra provocax*, *Cygnus melancoryphus*), su paisaje y el vínculo histórico de la comunidad con su humedal.

El 27 de julio de 1981 el Santuario se convirtió en el primer Sitio Ramsar de Chile al ser inscrito en la *Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas*, inscribiéndose como Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (SR). La extensión territorial del sitio incluye el lecho del río, bañados, bosques pantanosos y humedales palustres.

El presente informe tiene por propósito difundir las estadísticas del monitoreo permanente que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realiza en el SN SR de las 35 especies monitoreadas y que fue realizado el 24 de septiembre de 2025.

Esta información es recabada mensualmente por guardaparques del Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar. Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha. La metodología empleada se basa en conteos visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos de observación fuera

¹ Ley 17.288 de 1970 Legisla sobre Monumentos Nacionales.

² Decreto N° 41, 16/12/2015, Ministerio del Medio Ambiente.

del Santuario) y estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

3 Metodología

Si bien es cierto el SN SR posee una diversidad de avifauna de 119 especies³, en el presente informe se da cuenta del monitoreo de 35 especies, en base a dos métodos:

- a) Una es la utilización de estaciones de punto fijo en altura los cuales permiten contabilizar las especies de mayor tamaño (cisne de cuello negro *Cygnus melancoryphus*, cormorán yeco *Nannopterum brasilianum*, taguas *Fulica sp*, entre otras).
- b) La otra metodología es la de conteos desde una embarcación con *tracks* (recorridos) de navegación determinados. Este método permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (pimpollo *Rollandia rolland*, picurio *Podilymbus podiceps*, garza cuca *Ardea cocoi*, garza grande *Casmerodius albus*, garza chica *Egretta thula*, águila pescadora *Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario-Sitio Ramsar. La metodología descrita para el caso de los cisnes se viene realizando desde 1982, pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999.

Adicionalmente, se registran otras especies de avifauna que se observan durante el monitoreo.


Dentro del SN se encuentran 16 puntos de observación que son utilizados para realizar el conteo de avifauna mensual, de los cuales 9 puntos de observación consideran miradores naturales (cerros, miradores) y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Isla Teja (sector), Frutillar, Punucapa, San Pedro, San Ramón, Fundo Altue, Fundo Plaza de Armas, Locuche y Cuyinhue.

³ Plan de Manejo del Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter. CONAF. 2019.

El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de creación de la Reserva Nacional Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y Pichoy. Desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal (contaminación por la planta de celulosa instalada aguas arriba), se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del santuario con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo externo que en su momento llegó a 11 sitios, actualmente considera 3 sitios: Pichoy, San Antonio y Pailapifil (mapa 1). Adicionalmente, otros puntos como La Esperanza o Chancoyán si es necesario.

Nuestra taxonomía de especies sigue la lista patrón de Clements (2022). Esta lista es una clasificación sistemática de las aves del mundo que es seguida por la mayoría de las autoridades en el continente americano, sometida al comité de la *American Ornithologist Union* AOU y el Comité de Clasificación de América del Sur (SACC).⁴

⁴ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, S. M. Billerman, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2022. The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2022. Downloaded from <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>



Mapa 1: Monitoreo interno y externo en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo– Sitio Ramsar Carlos Anwandter, Región de Los Ríos.

4 Resultados

4.1 Cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*)

4.1.1 Dentro del Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar.

Se contabilizó un total de 3.096 individuos, cuyo desglose etario se compone de 2.998 adultos y 98 polluelos (Tabla 1). En cuanto a su distribución espacial, la población se concentró mayoritariamente en el sector centro-norte; específicamente, sector Santa María presentó la mayor densidad de *C. melancoryphus* con 2.085 ejemplares, seguida por el sector de San Martín con 442 registros (Anexo 5.1). Respecto al análisis comparativo, la abundancia del presente mes muestra estabilidad en relación con agosto (3.052 individuos) y un incremento significativo respecto a septiembre de 2024, periodo en que se registraron 1.075 ejemplares. No obstante, cabe destacar que la cifra actual representa el registro más alto para un mes de septiembre desde 2020, cuando la población alcanzó los 8.357 individuos.



Figura 1. Abundancia de cisnes de cuello negro período enero 1999 – septiembre 2025.

n° de Parejas de cisne de cuello negro con polluelos															
Sector N° polluelos	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Isla Teja	Cayumapu	Fuerte San Luis de Alba	Bellavista	San Antonio	Río Pichoy	TOTAL PAREJAS	TOTAL POLLUELOS
1				1	1									2	2
2					4	1		1				1	2	9	18
3		1		2	5	2		2				1		13	39
4		1			1	4							1	7	28
5					1									1	5
6					1									1	6
7														0	0
														33	98

Tabla 1: Parejas de cisnes de cuello negro con polluelos registradas en el monitoreo septiembre 2025.

4.1.2 Zonas aledañas al Santuario de la Naturaleza –Sitio Ramsar.

Un total de 516 ejemplares de cisne de cuello negro se registraron en las zonas aledañas (tabla 2): 466 adultos y 50 polluelos. El sector de Bellavista (217) y San Antonio(171) presentaron los mayores registros.

ESPECIE	sector							Total
	Pichoy	Bellavista	La Punta	San Antonio	Puente Cancahual	Pailapifil	Cayumapu	
Cisnes de cuelle negro	14	217	6	149	4	76		466
Cinses de c. n. polluelos	4		19	22		5		50
Garza grande				1				1
Pato real						2		2
Queltehue						2		2
Run run		4						4
Gaviotín piquerito		10						10

Tabla 2: abundancias monitoreo externo, septiembre 2025.

4.1.3 Abundancia total en el Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar y zonas aledañas.

La abundancia total asciende a 3.612 ejemplares (anexo 5.2 figura 2).




Figura 2. Abundancia de cisne de cuello negro, dentro del área protegida (___), fuera (___) y acumulada (___) del Santuario de la Naturaleza-Sitio Ramsar, período enero 2006 – septiembre 2025.

Se entrega información de otras aves registradas durante el monitoreo y su comparación con el mes pasado y septiembre de los últimos cuatro años. Se incluyen gráficos período 1999 – septiembre 2025.

4.2 Taguas (Fulica armillata, F. leucoptera, F. rufifrons)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	117
Agosto	248
Septiembre 2024	302
Septiembre 2023	143
Septiembre 2022	359
Septiembre 2021	950




Figura 3. Abundancia taguas período enero 1999 – septiembre 2025.

Zambullidores

4.3 Huala (*Podiceps major*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	75
Agosto	79
Septiembre 2024	75
Septiembre 2023	49
Septiembre 2022	61
Septiembre 2021	41




Figura 4. Abundancia huala período enero 1999 – septiembre 2025.

4.4 Picurio (*Podilymbus podiceps*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	3
Agosto	4
Septiembre 2024	0
Septiembre 2023	3
Septiembre 2022	1
Septiembre 2021	1




Figura 5. Abundancia picurio, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.5 Pimpollo (*Rollandia rolland*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	4
Agosto	0
Septiembre 2024	0
Septiembre 2023	8
Septiembre 2022	4
Septiembre 2021	5




Figura 6. Abundancia pimpollo, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.6 Garza boyera (*Ardea ibis*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	0
Agosto	0
Septiembre 2024	0
Septiembre 2023	0
Septiembre 2022	0
Septiembre 2021	0




Figura 7. Abundancia garza boyera, período enero 1999 – sep. 2025.

4.7 Garza chica (*Egretta thula*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	5
Agosto	13
Septiembre 2024	54
Septiembre 2023	35
Septiembre 2022	144
Septiembre 2021	50




Figura 8. Abundancia garza chica, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.8 Garza cuca (*Ardea cocoi*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	125
Agosto	39
Septiembre 2024	24
Septiembre 2023	44
Septiembre 2022	58
Septiembre 2021	33




Figura 9. Abundancia garza cuca, período enero de 1999 – septiembre 2025.

4.9 Garza grande (*Ardea alba*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	8
Agosto	9
Septiembre 2024	14
Septiembre 2023	33
Septiembre 2022	44
Septiembre 2021	38




Figura 10. Abundancia garza grande, período enero 1999 – septiembre 2025.

Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos

4.10 Cormorán yeco (*Nannopterum brasilianum*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	255
Agosto	153
Septiembre 2024	248
Septiembre 2023	75
Septiembre 2022	119
Septiembre 2021	98




Figura 11. Abundancia cormorán yeco, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.11 Zarapito (*Numenius phaeopus*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	0
Agosto	0
Septiembre 2024	7
Septiembre 2023	0
Septiembre 2022	33
Septiembre 2021	45




Figura 12. Abundancia zarapito, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.12 Gaviota cáhuil (*Chroicocephalus maculipennis*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	1.767
Agosto	663
Septiembre 2024	1.098
Septiembre 2023	263
Septiembre 2022	159
Septiembre 2021	307




Figura 13. Abundancia gaviota cáhuil, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.13 Gaviotín piquerito (*Sterna trudeaui*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	55
Agosto	1
Septiembre 2024	24
Septiembre 2023	17
Septiembre 2022	10
Septiembre 2021	16




Figura 14. Abundancia gaviotín piquerito, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.14 Trile (Agelasticus thilius)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	21
Agosto	0
Septiembre 2024	8
Septiembre 2023	28
Septiembre 2022	8
Septiembre 2021	0




Figura 15. Abundancia de trile, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.15 Siete colores (*Tachuris rubrigastra*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	11
Agosto	6
Septiembre 2024	6
Septiembre 2023	0
Septiembre 2022	6
Septiembre 2021	3




Figura 16. Abundancia siete colores, período enero 1999 – septiembre 2025.

Patos

4.16 Pato anteojillo (*Specularnas specularis*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	0
Agosto	0
Septiembre 2024	0
Septiembre 2023	0
Septiembre 2022	0
Septiembre 2021	0




Figura 17. Abundancia pato anteojillo, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.17 Patos jergones (*Anas georgica*, *A. flavirostris*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	11
Agosto	12
Septiembre 2024	6
Septiembre 2023	0
Septiembre 2022	24
Septiembre 2021	12




Figura 18. Abundancia pato jergón, enero 1999 – septiembre 2025.

4.18 Pato real (*Mareca sibilatrix*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	64
Agosto	18
Septiembre 2024	54
Septiembre 2023	20
Septiembre 2022	28
Septiembre 2021	6




Figura 19. Abundancia pato real, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.19 Pelicano (*Pelecanus thagus*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	0
Agosto	0
Septiembre 2024	5
Septiembre 2023	5
Septiembre 2022	3
Septiembre 2021	6




Figura 20. Abundancia pelicano, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.20 Traro, carancho (*Caracara plancus*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	2
Agosto	1
Septiembre 2024	0
Septiembre 2023	2
Septiembre 2022	5
Septiembre 2021	6




Figura 21. Abundancia traro, período enero 1999 – septiembre 2025.

4.21 Tiuque (*Daptrius chimango*)

Mes	Abundancia (nº)
Septiembre	24
Agosto	28
Septiembre 2024	2
Septiembre 2023	23
Septiembre 2022	15
Septiembre 2021	22




Figura 22. Abundancia tiuque, período enero 1999 – septiembre 2025.

5 Anexos

Anexo 5.1 Resultados del monitoreo realizado al interior del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, septiembre de 2025.

ESPECIE	Sector 1				Sector 2	Sector 3		Sector 4				Otros sectores				TOTAL
	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bellavista	Fuerte San Luis	Locuche	Cuyinhue	Isla Teja	Cayumapu	San Antonio	Río Pichoy	
Águila pescadora																0
Banduria							3							3		6
Becacina																0
Cisne coscoroba																0
Cisne cuello negro		45	43	93	190	2.051	442					6		56	72	2.998
Cisne cn juvenil																0
Cisne cn polluelo		7		7	39	24						8		5	8	98
Cormorán yeco		3	29		18	191			2					6	6	255
Cuervo del pantano						2										2
Garza boyera																0
Garza chica					5											5
Garza cuca				2	2	112									9	125
Garza grande		1		1	2										4	8
Gaviota cáhuil		747		180	346	209	88		6					100	91	1.767
Gavotín piquerito		3		4	19	4								13	12	55
Gaviota dominicana		2												2	1	5
Huairavillo																0
Huairavo																0
Huala		10		11	24	13	4							3	10	75
Martín pescador					1											1
Pato anteojo																0
Patos jergones					7		2								2	11
Pato negro																0
Pato real			2		45	2	8							3	4	64
Pelicano																0
Picurio		2			1											3
Pidén																0
Pimpollo				2		2										4
Queltehue		2	4	3	8	6	2								2	27
Run Run														2	5	7
Siete colores		7			2										2	11
Taguas		90	2	15	10											117
Tagüita																0
Tiuque				2	4	5								8	5	24
Traro					2											2
Trile		4			5	10									2	21
Zarapito																0
Otro: Jotes		2				5								2		9
Otro: Golondrina chilena						6									20	26
Otro: Churrín del sur		1														1
Otro: Churrín de la mocha		1														1
Otro: Tordo					7											7
Otro: Jilguero					20											20
Otro: Trabajador					2											2

Anexo 5.2 Valores de abundancia mensual cisnes de cuello negro dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza - Sitio Ramsar, período noviembre 2002 – septiembre 2025.

AÑO	MES	Abundancia SNSR (n°)	Abundancia zona aledaña (n°)	Suma de abundancias (n°)
2002	N	5.030		
	D	5.328		
2003	E	5.664		
	F	6.044		
	M	6.280		
	A	6.364		
	M	5.795		
	J	5.391		
	J	6.047		
	A	5.941		
	S	5.598		
	O	5.171		
	N	4.935		
	D	5.458		
2004	E	5.932		
	F	6.266		
	M	6.483		
	A	7.997		
	M	7.983		
	J	6.512		
	J	5.388		
	A	3.411		
	S	3.674		
	O	2.180		
	N	2.942		
	D	2.324	1.100	3.424
2005	E	942	1.907	2.849
	F	289	2.282	2.571
	M	570	2.018	2.588
	A	866	1.219	2.085
	M	518	288	806
	J	476	303	779
	J	290	243	533
	A	249	150	399
	S	398	295	693
	O	689	229	918
	N	680	315	995
	D	668	168	836
2006	E	436	536	972

	F	1.028	562	1.590
	M	803	402	1.205
	A	819	124	943
	M	366	543	909
	J	304	625	929
	J	253	238	491
	A	401	224	625
	S	670	285	955
	O	654	466	1.120
	N	601	925	1.526
	D	372	501	873
2007	E	386	543	929
	F	252	370	622
	M	547	510	1.057
	A	616	474	1.090
	M	379	530	909
	J	383	701	1.084
	J	297	744	1.041
	A	542	426	968
	S	806	689	1.495
	O	907	501	1.408
	N	877	658	1.535
	D	251	392	643
2008	E	311	969	1.280
	F	214	276	490
	M	360	1.398	1.758
	A	352	1.720	2.072
	M	371	1.131	1.502
	J	249	942	1.191
	J	272	714	986
	A	252	431	683
	S	869	338	1.207
	O	972	563	1.535
	N	1.084	443	1.527
	D	1.376	349	1.725
2009	E	698	1.326	2.024
	F	613	1.289	1.902
	M	166	2.801	2.967
	A	90	4.630	4.720
	M	111	2.882	2.993
	J	158	1.251	1.409
	J	283	642	925
	A	296	685	981
	S	668	472	1.140
	O	445	620	1.065
	N	444	675	1.119

	D	581	567	1.148
2010	E	922	380	1.302
	F	972	274	1.246
	M	637	898	1.535
	A	352	754	1.106
	M	270	608	878
	J	222	518	740
	J	568	801	1.369
	A	241	533	774
	S	326	352	678
	O	407	532	939
	N	626	145	771
	D	593	790	1.383
2011	E	668	726	1.394
	F	180	1.165	1.345
	M	101	1.416	1.517
	A	165	1.782	1.947
	M	200	1.995	2.195
	J	627	1.178	1.805
	J	466	564	1.030
	A	327	353	680
	S	607	293	900
	O	730	190	920
	N	753	198	951
	D	516	223	739
2012	E	1.798	241	2.039
	F	2.176	336	2.512
	M	1.039	854	1.893
	A	1.311	1.005	2.316
	M	790	1.155	1.945
	J	644	850	1.494
	J	1.246	473	1.719
	A	1.064	166	1.230
	S	1.220	293	1.513
	O	1.197	114	1.311
	N	2.014	100	2.114
	D	1.428	196	1.624
2013	E	1.699	277	1.976
	F	1.519	733	2.252
	M	1.833	815	2.648
	A	1.430	932	2.362
	M	1.606	1.594	3.200
	J	1.442	1.065	2.507
	J	1.898	337	2.235
	A	1.789	214	2.003
	S	1.556	269	1.825

	O	1.897	162	2.059
	N	1.949	163	2.112
	D	2.816	280	3.096
2014	E	2.323	692	3.015
	F	3.062	930	3.992
	M	3.524	1.315	4.839
	A	2.821	957	3.778
	M	3.632	659	4.291
	J	3.426	799	4.225
	J	3.210	216	3.426
	A	3.498	400	3.898
	S	3.369	447	3.816
	O	2.766	325	3.091
	N	2.308	479	2.787
	D	2.958	372	3.330
2015	E	2.764	435	3.199
	F	3.121	680	3.801
	M	4.053	918	4.971
	A	3.794	540	4.334
	M	3.692	757	4.449
	J	3.650	584	4.234
	J	4.395	624	5.019
	A	3.598	274	3.872
	S	3.208	327	3.535
	O	3.396	299	3.695
	N	2.151	165	2.316
	D	2.251	293	2.544
2016	E	3.820	259	4.079
	F	3.297	385	3.682
	M	5.889	928	6.817
	A	6.815	1.241	8.056
	M	8.435	992	9.427
	J	6.238	800	7.038
	J	5.686	729	6.415
	A	4.347	698	5.045
	S	4.563	871	5.434
	O	5.324	675	5.999
	N	5.770	625	6.395
	D	6.632	771	7.403
2017	E	6.692	769	7.461
	F	6.517	1.033	7.550
	M	8.431	1.332	9.763
	A	9.800	775	10.575
	M	10.362	647	11.009
	J	9.011	912	9.923
	J	8.375	1.455	9.830

	A	8.703	750	9.453
	S	7.290	727	8.017
	O	7.962	285	8.247
	N	8.134	506	8.640
	D	9.066	556	9.622
2018	E	11.502	721	12.223
	F	12.955	1.175	14.130
	M	12.314	956	13.270
	A	10.834	1.440	12.274
	M	10.817	1.110	11.927
	J	11.565	700	12.265
	J	9.526	575	10.101
	A	8.192	517	8.709
	S	7.192	915	8.107
	O	7.855	2.416	10.271
	N	8.392	920	9.312
	D	10.625	1.032	11.657
2019	E	16.594	1.097	17.691
	F	14.854	904	15.758
	M	14.990	940	15.930
	A	16.223	453	16.676
	M	14.191	501	14.692
	J	13.456	731	14.187
	J	13.306	805	14.111
	A	10.720	715	11.435
	S	7.987	409	8.396
	O	11.199	sin dato	11.199
	N	12.623	403	13.026
	D	9.924	387	10.311
2020	E	9.519	377	16.724
	F	16.347	261	16.608
	M	14.189	sin dato	14.189
	A	21.123	sin dato	21.123
	M	22.419	1.532	23.951
	J	14.648	2.650	17.298
	J	5.166	6.253	11.419
	A	7.414	263	7.677
	S	8.357	sin dato	8.357
	O	10.709	sin dato	10.709
	N	11.326	402	11.728
	D	11.024	153	11.177
2021	E	9.040	30	9.070
	F	12.096	192	12.288
	M	9.390	1.060	10.450
	A	6.599	1.286	7.885
	J*	1.893	763	2.656

	J	958	1.783	2.741
	J	5.176	414	5.590
	A	905	3.214	4.119
	S	1.479	728	2.207
	O	3.826	857	4.683
	N	4.928	337	5.265
	D	5.794	1.496	7.290
2022	E	7.556	41	7.597
	F	2.508	713	3.221
	M	4.954	37	4.991
	A	3577	695	4.272
	M	2782	381	3.163
	J	440	807	1.247
	J	1.801	1.150	2.951
	A	2.020	427	2.447
	S	2.372	718	3.090
	O	7.969	414	8.383
	N	4.528	366	4.894
	D	4.121	88	4.209
2023	E	5.739	191	5.930
	F	5.831	sin dato	5.831
	M	5.595	sin dato	5.595
	A	5.661	199	5.860
	M	4.882	857	5.739
	J	1.437	325	1.762
	J	1.931	sin dato	1.931
	A	2.120	464	2.584
	S	1.287	327	1.614
	O	1.539	37	1.576
	N	2.071	243	2.314
	D	2.896	sin dato	2.896
2024	E	4.112	46	4.158
	F	4.792	38	4.830
	M	3.198	7	3.205
	A	5.362	31	5.393
	M	2.359	202	2.561
	J	370	1.213	1.583
	J	2.505	49	2.554
	A	1.884	424	2.308
	S	1.075	364	1.439
	O	3.518	181	3.699
	N	2.943	244	3.187
	D	2.603	29	2.632
2025	E	3.530	47	3.577
	F	5.898	3	5.901

M	4.131	Sin dato	4.131
A	5.424	sin dato	5.424
M	1.253	779	2.032
J	4.544	503	5.047
J	4.350	49	4.399
A	3.052	191	3.243
S	3.096	516	3.612

Anexo 5.3 Resumen abundancias (n°, %) monitoreo 24 de septiembre de 2025 en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter.

ESPECIE	Abundancia (n.º)	Abundancia (%)
Águila pescadora	0	0,00%
Bandurria	6	0,10%
Becacina	0	0,00%
Cisne coscoroba	0	0,00%
Cisne cuello negro	3.096	53,78%
Cormorán yeco	255	4,43%
Cuervo del pantano	2	0,03%
Garza boyera	0	0,00%
Garza chica	5	0,09%
Garza cuca	125	2,17%
Garza grande	8	0,14%
Gaviota cáhuil	1.767	30,69%
Gaviotín piquerito	55	0,96%
Gaviota dominicana	5	0,09%
Huairavillo	0	0,00%
Huairavo	0	0,00%
Huala	75	1,30%
Martín pescador	1	0,02%
Pato anteojillo	0	0,00%
Patos jergones	11	0,19%
Pato negro	0	0,00%
Pato real	64	1,11%
Pelícano	0	0,00%
Picurio	3	0,05%
Pidén	0	0,00%
Pimpollo	4	0,07%
Queltehue	27	0,47%
Run Run	7	0,12%
Siete colores	11	0,19%
Taguas	117	2,03%
Tagüita	0	0,00%
Tiuque	24	0,42%
Traro	2	0,03%
Trile	21	0,36%
Zarapito	0	0,00%
Otro: Jotes	9	0,16%
Otro: Golondrina chilena	26	0,45%
Otro: Trabajador	0	0,00%
Otro: Churrín del suro	1	0,02%
Otro: Churrín de la mocha	1	0,02%
Otro: Tordo	7	0,12%
Otro: Jilguero	20	0,35%
Otro: Trabajador	2	0,03%
TOTAL	5.757	100,00%

Anexo 5.4 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero 2000 – septiembre 2025.

	n° cisnes de cuello negro												
año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	Promedio
2000	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	5.637
2001	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	4.767
2002	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	5.777
2003	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	5.724
2004	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	5.091
2005	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	553
2006	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	559
2007	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	520
2008	311	214	360	352	726	249	272	252	869	972	1.084	1.376	586
2009	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	379
2010	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	511
2011	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	445
2012	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	1.327
2013	1.699	1.519	1.833	1.430	1.606	1.442	1.898	1.789	1.556	1.897	1.949	2.816	1.786
2014	2.323	3.062	3.524	2.821	3.632	3.426	3.210	3.498	3.369	2.766	2.308	2.958	3.075
2015	2.764	3.121	4.053	3.794	3.692	3.650	4.395	3.598	3.208	3.396	2.151	2.251	3.339
2016	3.820	3.297	5.889	6.815	8.435	6.238	5.686	4.347	4.563	5.324	5.770	6.632	5.568
2017	6.692	6.517	8.431	9.800	10.362	9.011	8.375	8.649	7.290	8.012	8.119	9.066	8.360
2018	11.502	12.955	12.314	10.834	10.817	11.565	9.526	8.192	7.192	7.855	8.392	10.625	10.147
2019	16.594	14.854	14.990	16.223	14.191	13.456	13.306	10.720	7.987	11.199	12.623	9.924	13.006
2020	9.519	16.347	14.189	21.123	22.419	14.648	5.166	7.414	8.357	10.709	11.326	11.024	12.687
2021	9.040	12.096	9.390	6.599	1.893	958	5.176	905	1.479	3.826	4.928	5.794	5.174
2022	7.556	2.508	4.954	3.577	2.782	440	1.801	2.020	2.372	7.969	4.528	4.121	3.719
2023	5.739	5.831	5.595	5.661	4.882	1.437	1.931	2.120	1.287	1.539	2.701	2.896	3.468
2024	4.112	4.792	3.198	5.362	2.359	370	2.505	1.884	1.075	3.518	2.943	2.603	2.893
2025	3.530	5.898	4.131	5.424	1.253	4.544	4.350	3.052	3.096				3.920

Anexo 5.5 Inventario de especies presentes en el SN SR basado en la información disponible en los registros de CONAF y complementado con la base de datos de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Fuente: GBIF.org (20 de abril de 2022) Descarga de ocurrencia de GBIF <https://doi.org/10.15468/dl.fpxg9t>. RCE = Reglamento Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente.

Orden	Familia	ESPECIES	Nombre común	RCE
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Peuco	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo polyosoma</i>	Aguilucho común	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Bailarín	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Águila	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus cinereus</i>	Vari ceniciento	
Accipitriformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Jote de cabeza colorada	
Accipitriformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Jote de cabeza negra	
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus melancoryphus</i>	Cisne de cuello negro	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas flavirostris</i>	Pato jergón chico	
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca sibilatrix</i>	Pato Real	
Anseriformes	Anatidae	<i>Specularnas specularis</i>	Pato anteojillo	NT
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas georgica</i>	Pato jergón grande	
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platylea</i>	Pato Cuchara	
Anseriformes	Anatidae	<i>Netta peposaca</i>	Pato negro	
Anseriformes	Anatidae	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Cisne coscoroba	LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor chico	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue común	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius falklandicus</i>	Chorlo de doble collar	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius modestus</i>	Chorlo chileno	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna trudeaui</i>	Gaviotín piquerito	
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Gaviota cáhuil	
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana	
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna hirundinacea</i>	Gaviotín sudamericano	
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Gaviota de Franklin	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Thalasseus elegans</i>	Gaviotín elegante	NT
Charadriiformes	Laridae	<i>Rynchops niger</i>	Rayador	
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Perrito	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito común	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Pitotoy grande	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa haemastica</i>	Zarapito de pico recto	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguayae</i>	Becacina	LC

Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Pitotoy chico	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas araucana</i>	Torcaza	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Paloma doméstica	
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador	
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	Traro	
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo	
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino	LC
Galliformes	Odontophoridae	<i>Callipepla californica</i>	Codorniz	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica armillata</i>	Tagua común	
Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Pidén común	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica rufifrons</i>	Tagua de frente roja	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica leucoptera</i>	Tagua chica	
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Taguita del norte	
Gruiformes	Rallidae	<i>porphyriops melanops</i>	Taguita común	
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus jamaicensis</i>	Pidencito	EN (XV-III), NT (IV-XII)
Passeriformes	Cotingidae	<i>Phytotoma rara</i>	Rara	
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus barbatus</i>	Jilguero austral	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes patagonicus</i>	Churrete patagónico	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Phleocryptes melanops</i>	Trabajador	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Aphrastura spinicauda</i>	Rayadito	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	Colilarga	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	Comesebo grande	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral común	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Golondrina chilena	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Golondrina barranquera	
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Mirlo común	
Passeriformes	Icteridae	<i>Agelastus thilius</i>	Trile	
Passeriformes	Icteridae	<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	
Passeriformes	Icteridae	<i>Sturnella loyca</i>	Loica	
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus thenca</i>	Tenca chilena	
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus correndera</i>	Bailarín chico común	
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scelorchilus rubecula</i>	Chuca	LC
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus magellanicus</i>	Churrín del sur	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Eugralla paradoxa</i>	Churrín de la mocha	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Pteroptochos tarnii</i>	Hued-hued del sur	LC
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus patagonicus</i>	Cometocino patagónico	

Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	Chirihue común	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Diuca diuca</i>	Diuca común	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán común	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Cistothorus platensis</i>	Chercán de las vegas	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal patagónico	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia albiceps</i>	Fío-fío	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis pyrope</i>	Diucón	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tachuris rubrigastra</i>	Siete colores	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito común	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hymenops perspicillatus</i>	Run-run	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	Viudita	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola maclovianus</i>	Dormilona tontita	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	Garza cuca	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza grande	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Garza chica	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus involucris</i>	Huairavillo común	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Huairavo común	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza bueyera	
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano de Humboldt	NT
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus melanopis</i>	Bandurria común	LC
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	Cuervo de pantano común	NT
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes pitius</i>	Pitio austral	
Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis lignarius</i>	Carpinterito	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps major</i>	Huala	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	Pimpollo común	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Picurio	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps occipitalis</i>	Blanquillo	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	Choroy	LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Enicognathus ferrugineus</i>	Cachaña	
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium nana</i>	Chuncho austral	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Yeco	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	Lile	NT
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Leucocarbo atriceps</i>	Cormorán imperial	

LC = Preocupación menor

NT = Cercano a la amenaza

EN = En peligro



Santuario de la Naturaleza
Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Carlos Anwandter

www.parqueslosrios.cl



<https://www.ramsar.org/es>