

Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Carlos Anwandter



Informe Monitoreo Avifauna
Enero 2026

Oficina Provincial Valdivia



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Región de Los Ríos

Oficina Provincial Valdivia



Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter

Equipo:

Gp. Sr. Roberto Rosas Mena
Gp. Adm. Sr. Mario Maturana Arévalo
Srta. Bárbara Medina Figueroa

Portada:

Garza cuca (*Egretta thula*)

Ilustración de Juan Pablo Morales Pradenas

Agradecemos a los propietarios de predios particulares por las facilidades otorgadas para el monitoreo.

(Se permite el uso de la información sin fines comerciales mencionando la fuente de origen).

Contenido

1 Resumen	3
2 Introducción.....	4
3 Metodología.....	5
4 Resultados.....	8
4.1 Cisne de cuello negro (<i>Cygnus melancoryphus</i>)	8
4.1.1 Dentro del Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar.	8
4.1.2 Zonas aledañas al Santuario de la Naturaleza –Sitio Ramsar.....	9
4.1.3 Abundancia total en el Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar y zonas aledañas.....	9
4.2 Taguas (<i>Fulica armillata</i> , <i>F. leucoptera</i> , <i>F. rufifrons</i>)	10
4.3 Huala (<i>Podiceps major</i>)	10
4.4 Picurio (<i>Podilymbus podiceps</i>)	11
4.5 Pimpollo (<i>Rollandia rolland</i>)	11
4.6 Garza boyera (<i>Ardea ibis</i>)	11
4.7 Garza chica (<i>Egretta thula</i>)	12
4.8 Garza cuca (<i>Ardea cocoi</i>)	12
4.9 Garza grande (<i>Ardea alba</i>).....	12
4.10 Cormorán yeco (<i>Nannopterum brasilianum</i>)	13
4.11 Zarapito (<i>Numenius phaeopus</i>)	13
4.12 Gaviota cáhuil (<i>Chroicocephalus maculipennis</i>)	13
4.13 Gaviotín piquerito (<i>Sterna trudeaui</i>)	14
4.14 Trile (<i>Agelasticus thilius</i>).....	14
4.15 Pato anteojo (<i>Specularias specularis</i>)	14
4.16 Patos jergones (<i>Anas georgica</i> , <i>A. flavirostris</i>)	15
4.17 Pato real (<i>Mareca sibilatrix</i>)	15
4.18 Pelicano (<i>Pelecanus thagus</i>)	15
4.19 Traro, carancho (<i>Caracara plancus</i>)	16
4.20 Tiuque (<i>Daptrius chimango</i>)	16
5 Anexos.....	17
Anexo 5.1 Resultados del monitoreo realizado al interior del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero de 2026.....	17
Anexo 5.2 Valores de abundancia mensual cisnes de cuello negro dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza - Sitio Ramsar, período noviembre 2002 – enero 2026.	18
Anexo 5.3 Resumen abundancias (n°, %) monitoreo enero 2026 en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter.	24
Anexo 5.4 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero 2000 – enero 2026	25
Anexo 5.5 Inventario de especies presentes en el SN SR basado en la información disponible en los registros de CONAF y complementado con la base de datos de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Fuente: GBIF.org (20 de abril de 2022) Descarga de ocurrencia de GBIF https://doi.org/10.15468/dl.fpxg9t . RCE = Reglamento Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente.....	26

1 Resumen

Se presentan los resultados del monitoreo de avifauna de enero de 2026 en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter.

Se registraron 31 especies con un total de 4.460 individuos.

La mayor abundancia correspondió al cisne de cuello negro con 2.329 ejemplares (52,22%), seguido por el pato real con 1.063 (23,83%) y las taguas con 255 (5,72%).

Respecto a la población de cisnes de cuello negro, el 83,98% correspondió a adultos (1.956), el 10,13% a juveniles (236) y el 5,88% a polluelos (137).

2 Introducción

Inserto en el humedal del río Cruces, se encuentra el área bajo protección oficial del Estado de Chile denominada Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo (SN), creado por D.S. N° 2.734 del 3 de junio de 1981. Por estar bajo la categoría de protección que se incluye en la Ley 17.288¹ no se permite la extracción de recursos naturales.

Abarca una superficie² de 4.892,22 ha, ubicado en las comunas de Mariquina y Valdivia, Región de los Ríos, sur de Chile (mapa 1). El origen del humedal está en el descenso de los terrenos aledaños a los cursos de agua y su posterior inundación como consecuencia del terremoto de mayo de 1960 que afectó al sur de Chile. El SN SR es importante por la biodiversidad que contiene, más de 20 especies de mamíferos y 119 de aves, la protección que otorga a especies con problemas de conservación (*Lontra provocax*, *Cygnus melancoryphus*), su paisaje y el vínculo histórico de la comunidad con su humedal.

El 27 de julio de 1981 el Santuario se convirtió en el primer Sitio Ramsar de Chile al ser inscrito en la *Convención sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas*, inscribiéndose como Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (SR). La extensión territorial del sitio incluye el lecho del río, bañados, bosques pantanosos y humedales palustres.

El presente informe tiene por propósito difundir las estadísticas del monitoreo permanente que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, realiza en el SN SR de las 35 especies monitoreadas y correspondientes a

Esta información es recabada mensualmente por guardaparques del Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar. Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha. La metodología empleada se basa en conteos visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos de observación fuera

¹ Ley 17.288 de 1970 Legisla sobre Monumentos Nacionales.

² Decreto N° 41, 16/12/2015, Ministerio del Medio Ambiente.

del Santuario) y estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

3 Metodología

Si bien es cierto el SN SR posee una diversidad de avifauna de 119 especies³, en el presente informe se da cuenta del monitoreo de 35 especies, en base a dos métodos:

- a) Una es la utilización de estaciones de punto fijo en altura los cuales permiten contabilizar las especies de mayor tamaño (cisne de cuello negro *Cygnus melancoryphus*, cormorán yeco *Nannopterum brasilianum*, taguas *Fulica sp*, entre otras).
- b) La otra metodología es la de conteos desde una embarcación con *tracks* (recorridos) de navegación determinados. Este método permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (pimpollo *Rollandia rolland*, picurio *Podilymbus podiceps*, garza cuca *Ardea cocoi*, garza grande *Ardea alba*, garza chica *Egretta thula*, águila pescadora *Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario-Sitio Ramsar. La metodología descrita para el caso de los cisnes se viene realizando desde 1982, pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999.

Adicionalmente, se registran otras especies de avifauna que se observan durante el monitoreo.


Dentro del SN se encuentran 16 puntos de observación que son utilizados para realizar el conteo de avifauna mensual, de los cuales 9 puntos de observación consideran miradores naturales (cerros, miradores) y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Isla Teja (sector), Frutillar, Punucapa, San Pedro, San Ramón, Fundo Altue, Fundo Plaza de Armas, Locuche y Cuyinhue.

³ Plan de Manejo del Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter. CONAF. 2019.

El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de creación de la Reserva Nacional Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y Pichoy. Desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal (contaminación por la planta de celulosa instalada aguas arriba), se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del santuario con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo externo que en su momento llegó a 11 sitios, actualmente considera 3 sitios: Pichoy, San Antonio y Pailapifil (mapa 1). Adicionalmente, otros puntos como La Esperanza o Chancoyán si es necesario.

Nuestra taxonomía de especies sigue la lista patrón de Clements (2022). Esta lista es una clasificación sistemática de las aves del mundo que es seguida por la mayoría de las autoridades en el continente americano, sometida al comité de la *American Ornithologist Union* AOU y el Comité de Clasificación de América del Sur (SACC).⁴

⁴ Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, S. M. Billerman, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2022. The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2022. Downloaded from <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>



Mapa 1: Monitoreo interno y externo en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo– Sitio Ramsar Carlos Anwandter, Región de Los Ríos.

4 Resultados

4.1 Cisne de cuello negro (*Cygnus melancoryphus*)

4.1.1 Dentro del Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar.

El monitoreo de este mes registró un total de 2.329 cisnes de cuello negro, lo que representa una disminución frente a los 3.018 individuos contabilizados en diciembre pasado.

La distribución de la población se desglosa de la siguiente manera:

Adultos: 1.956 individuos (83.98%); juveniles 236 individuos (10.13%) (tabla 2), polluelos 137 individuos (5.88%) (tabla 1).

Los sectores con mayor presencia de cisnes fueron San Antonio (523 registros), Santa María (500 individuos) y Puerto Claro (468).



Figura 1. Abundancia de cisnes de cuello negro período enero 1999 – enero 2026.

n° de Parejas de cisne de cuello negro con polluelos													
Sector N° polluelos	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Fuerte San Luis de Alba	Bellavista	San Antonio	Río Pichoy	TOTAL PAREJAS	TOTAL POLLUELOS
1		2		1		1				1		5	5
2		5		2	2	2				5		16	32
3		3		3	4	1	2			8		21	63
4		1	1	2	4							8	32
5		1										1	5
6												0	0
7												0	0
												51	137

Tabla 1: Parejas de cisnes de cuello negro con polluelos registradas en el monitoreo enero 2026.

n° de parejas de cisne de cuello negro con juveniles																
Sector N° juveniles	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Isla Teja	Cayumapu	Bellavista	San Antonio	Fuerte San Luis	Isla Teja	Río Pichoy	TOTAL PAREJAS	TOTAL JUVENILES
1		1			2	2									5	5
2		3			2		1								6	12
3		6	1		3	6									16	48
4		1	1	1		1					4				8	32
5						4					15				19	95
6											5				5	30
7															0	0
															59	222

Tabla 2: Parejas de cisnes de cuello negro con juveniles registradas en el monitoreo enero 2026.

4.1.2 Zonas aledañas al Santuario de la Naturaleza –Sitio Ramsar.

En las zonas aledañas se registraron solo 2 individuos de *C. melancoryphus* (tabla 3).

ESPECIE	sector			Total
	Puente Pichoy	San Antonio	Pailapifil	
Cisnes de cuello negro			2	2
Garza cuca			2	2
Traro, carancho			3	3
Pato real		29		29
Gaviota cáhuil		1		1

Tabla 3: abundancias monitoreo externo, enero 2026.

4.1.3 Abundancia total en el Santuario de la Naturaleza – Sitio Ramsar y zonas aledañas.

La abundancia total alcanzó a 2.331 individuos (anexo 5.2).




Figura 2. Abundancia de cisne de cuello negro, dentro del área protegida (___), fuera (___) y acumulada (___) del Santuario de la Naturaleza-Sitio Ramsar, período enero 2006 – enero 2026.

Se entrega información de otras aves registradas durante el monitoreo y su comparación con el mes pasado y enero de los últimos cuatro años. Se incluyen gráficos período 1999 – enero 2026.

4.2 Taguas (*Fulica armillata*, *F. leucoptera*, *F. rufifrons*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	255
Diciembre 2025	313
Enero 2025	188
Enero 2024	181
Enero 2023	309
Enero 2022	812




Figura 3. Abundancia taguas período enero 1999 – enero 2026.

4.3 Huala (*Podiceps major*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	101
Diciembre 2025	120
Enero 2025	84
Enero 2024	88
Enero 2023	54
Enero 2022	72




Figura 4. Abundancia huala período enero 1999 – enero 2026.

4.4 Picurio (*Podilymbus podiceps*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	2
Diciembre 2025	6
Enero 2025	6
Enero 2024	6
Enero 2023	3
Enero 2022	2




Figura 5. Abundancia picurio, período enero 1999 – enero 2026.

4.5 Pimpollo (*Rollandia rolland*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	0
Diciembre 2025	0
Enero 2025	6
Enero 2024	25
Enero 2023	9
Enero 2022	5




Figura 6. Abundancia pimpollo, período enero 1999 – enero 2026.

4.6 Garza boyera (*Ardea ibis*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	1
Diciembre 2025	52
Enero 2025	0
Enero 2024	0
Enero 2023	1
Enero 2022	5




Figura 7. Abundancia garza boyera, período enero 1999 – enero 2026.

4.7 Garza chica (*Egretta thula*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	30
Diciembre 2025	16
Enero 2025	10
Enero 2024	5
Enero 2023	62
Enero 2022	47




Figura 8. Abundancia garza chica, período enero 1999 – enero 2026.

4.8 Garza cuca (*Ardea cocoi*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	56
Diciembre 2025	82
Enero 2025	81
Enero 2024	64
Enero 2023	31
Enero 2022	22




Figura 9. Abundancia garza cuca, período enero de 1999 – enero 2026.

4.9 Garza grande (*Ardea alba*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	56
Diciembre 2025	31
Enero 2025	29
Enero 2024	50
Enero 2023	41
Enero 2022	31




Figura 10. Abundancia garza grande, período enero 1999 – enero 2026.

4.10 Cormorán yeco (*Nannopterum brasilianum*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	81
Diciembre 2025	92
Enero 2025	31
Enero 2024	159
Enero 2023	68
Enero 2022	70




Figura 11. Abundancia cormorán yeco, período enero 1999 – enero 2026.

4.11 Zarapito (*Numenius phaeopus*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	2
Diciembre 2025	1
Enero 2025	52
Enero 2024	70
Enero 2023	46
Enero 2022	4




Figura 12. Abundancia zarapito, período enero 1999 – enero 2026.

4.12 Gaviota cáhuil (*Chroicocephalus maculipennis*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	136
Diciembre 2025	1.202
Enero 2025	736
Enero 2024	1.095
Enero 2023	178
Enero 2022	169




Figura 13. Abundancia gaviota cáhuil, período enero 1999 – enero 2026.

4.13 Gaviotín piquerito (*Sterna trudeaui*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	1
Diciembre 2025	5
Enero 2025	1
Enero 2024	5
Enero 2023	1
Enero 2022	0




Figura 14. Abundancia gaviotín piquerito, período enero 1999 – enero 2026.

4.14 Trile (*Agelasticus thilius*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	0
Diciembre 2025	2
Enero 2025	9
Enero 2024	4
Enero 2023	0
Enero 2022	3




Figura 15. Abundancia de trile, período enero 1999 – enero 2026.

4.15 Pato anteojillo (*Specularias specularis*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	0
Diciembre 2025	0
Enero 2025	0
Enero 2024	0
Enero 2023	0
Enero 2022	0




Figura 16. Abundancia pato anteojillo, período enero 1999 – enero 2026.

4.16 Patos jergones (*Anas georgica*, *A. flavirostris*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	39
Diciembre 2025	6
Enero 2025	22
Enero 2024	205
Enero 2023	40
Enero 2022	37




Figura 17. Abundancia pato jergón, enero 1999 – enero 2026.

4.17 Pato real (*Mareca sibilatrix*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	1.063
Diciembre 2025	180
Enero 2025	2.008
Enero 2024	690
Enero 2023	106
Enero 2022	75




Figura 18. Abundancia pato real, período enero 1999 – enero 2026.

4.18 Pelícano (*Pelecanus thagus*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	0
Diciembre 2025	0
Enero 2025	0
Enero 2024	0
Enero 2023	0
Enero 2022	0




Figura 19. Abundancia pelícano, período enero 1999 – enero 2026.

4.19 Traro, carancho (*Caracara plancus*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	7
Diciembre 2025	1
Enero 2025	3
Enero 2024	1
Enero 2023	4
Enero 2022	3




Figura 20. Abundancia traro, período enero 1999 – enero 2026.

4.20 Tiuque (*Daptrius chimango*)

Mes	Abundancia (nº)
Enero	7
Diciembre 2025	9
Enero 2025	5
Enero 2024	3
Enero 2023	19
Enero 2022	22




Figura 21. Abundancia tiuque, período enero 1999 – enero 2026.

5 Anexos

Anexo 5.1 Resultados del monitoreo realizado al interior del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero de 2026.

ESPECIE	Sector 1				Sector 2	Sector 3		Sector 4				Otros sectores				TOTAL
	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bellavista	Fuerte San Luis	Locuche	Cuyinhue	Isla Teja	Cayumapu	San Antonio	Río Pichoy	
Águila pescadora							1									1
Bandurria			1	2												3
Becacina																0
Cisne coscoroba																0
Cisne cuello negro		345	27	39	468	500	13	18	17					523	6	1.956
Cisne cn juvenil		29	7	4	15	44	2	14						121		236
Cisne cn polluelo		30	4	22	32	8	6							35		137
Cormorán yeco		2	1	4	5	47	10							12		81
Cuervo del pantano																0
Garza boyera							1									1
Garza chica			2	1	10	9	1		1					4	2	30
Garza cuca		8	3	6	21	9	5	1	1						2	56
Garza grande		2	3	5	19	6	1	6	1					6	7	56
Gaviota cáhuil		67		10	9	21		20						3	6	136
Gaviotín piquerito		1														1
Gaviota dominicana				1	5											6
Huairavillo					1											1
Huairavo																0
Huala		44		25	20		4							4	4	101
Martín pescador																0
Pato anteojillo																0
Patos jergones			10	6	15	2			2						4	39
Pato negro																0
Pato real		92	19	34	550	183			105					80		1.063
Pelícano																0
Picurio			1			1										2
Pidén		3														3
Pimpollo																0
Queltehue		10	8	13	23	1	88		23						18	184
Run Run		2	1		3	1									1	8
Siete colores				2												2
Taguas		102	9	35	69										40	255
Tagüita																0
Tiuque		2				2	1								2	7
Traro				2	3			1						1		7
Trile																0
Zarapito			1	1												2
Otro: Jotes					6	5								4	1	16
Otro: Golondrina chilena			1			5	14		4						8	32
Otro: Trabajador															1	1
Otro: Chercán					1											1
Otro: Fío fío					1				4							5
Otro: Pitotoy grande					1											1
Otro: Loros (indeterminado)														30		30

Anexo 5.2 Valores de abundancia mensual cisnes de cuello negro dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza - Sitio Ramsar, período noviembre 2002 – enero 2026.

AÑO	MES	Abundancia SNSR (n°)	Abundancia zona aledaña (n°)	Suma de abundancias (n°)
2002	N	5.030		
	D	5.328		
2003	E	5.664		
	F	6.044		
	M	6.280		
	A	6.364		
	M	5.795		
	J	5.391		
	J	6.047		
	A	5.941		
	S	5.598		
	O	5.171		
	N	4.935		
	D	5.458		
2004	E	5.932		
	F	6.266		
	M	6.483		
	A	7.997		
	M	7.983		
	J	6.512		
	J	5.388		
	A	3.411		
	S	3.674		
	O	2.180		
	N	2.942		
	D	2.324	1.100	3.424
2005	E	942	1.907	2.849
	F	289	2.282	2.571
	M	570	2.018	2.588
	A	866	1.219	2.085
	M	518	288	806
	J	476	303	779
	J	290	243	533
	A	249	150	399
	S	398	295	693
	O	689	229	918
	N	680	315	995
	D	668	168	836
2006	E	436	536	972
	F	1.028	562	1.590

	M	803	402	1.205
	A	819	124	943
	M	366	543	909
	J	304	625	929
	J	253	238	491
	A	401	224	625
	S	670	285	955
	O	654	466	1.120
	N	601	925	1.526
	D	372	501	873
2007	E	386	543	929
	F	252	370	622
	M	547	510	1.057
	A	616	474	1.090
	M	379	530	909
	J	383	701	1.084
	J	297	744	1.041
	A	542	426	968
	S	806	689	1.495
	O	907	501	1.408
	N	877	658	1.535
	D	251	392	643
2008	E	311	969	1.280
	F	214	276	490
	M	360	1.398	1.758
	A	352	1.720	2.072
	M	371	1.131	1.502
	J	249	942	1.191
	J	272	714	986
	A	252	431	683
	S	869	338	1.207
	O	972	563	1.535
	N	1.084	443	1.527
	D	1.376	349	1.725
2009	E	698	1.326	2.024
	F	613	1.289	1.902
	M	166	2.801	2.967
	A	90	4.630	4.720
	M	111	2.882	2.993
	J	158	1.251	1.409
	J	283	642	925
	A	296	685	981
	S	668	472	1.140
	O	445	620	1.065
	N	444	675	1.119
	D	581	567	1.148

2010	E	922	380	1.302
	F	972	274	1.246
	M	637	898	1.535
	A	352	754	1.106
	M	270	608	878
	J	222	518	740
	J	568	801	1.369
	A	241	533	774
	S	326	352	678
	O	407	532	939
	N	626	145	771
	D	593	790	1.383
2011	E	668	726	1.394
	F	180	1.165	1.345
	M	101	1.416	1.517
	A	165	1.782	1.947
	M	200	1.995	2.195
	J	627	1.178	1.805
	J	466	564	1.030
	A	327	353	680
	S	607	293	900
	O	730	190	920
	N	753	198	951
	D	516	223	739
2012	E	1.798	241	2.039
	F	2.176	336	2.512
	M	1.039	854	1.893
	A	1.311	1.005	2.316
	M	790	1.155	1.945
	J	644	850	1.494
	J	1.246	473	1.719
	A	1.064	166	1.230
	S	1.220	293	1.513
	O	1.197	114	1.311
	N	2.014	100	2.114
	D	1.428	196	1.624
2013	E	1.699	277	1.976
	F	1.519	733	2.252
	M	1.833	815	2.648
	A	1.430	932	2.362
	M	1.606	1.594	3.200
	J	1.442	1.065	2.507
	J	1.898	337	2.235
	A	1.789	214	2.003
	S	1.556	269	1.825
	O	1.897	162	2.059

	N	1.949	163	2.112
	D	2.816	280	3.096
2014	E	2.323	692	3.015
	F	3.062	930	3.992
	M	3.524	1.315	4.839
	A	2.821	957	3.778
	M	3.632	659	4.291
	J	3.426	799	4.225
	J	3.210	216	3.426
	A	3.498	400	3.898
	S	3.369	447	3.816
	O	2.766	325	3.091
	N	2.308	479	2.787
	D	2.958	372	3.330
2015	E	2.764	435	3.199
	F	3.121	680	3.801
	M	4.053	918	4.971
	A	3.794	540	4.334
	M	3.692	757	4.449
	J	3.650	584	4.234
	J	4.395	624	5.019
	A	3.598	274	3.872
	S	3.208	327	3.535
	O	3.396	299	3.695
	N	2.151	165	2.316
	D	2.251	293	2.544
2016	E	3.820	259	4.079
	F	3.297	385	3.682
	M	5.889	928	6.817
	A	6.815	1.241	8.056
	M	8.435	992	9.427
	J	6.238	800	7.038
	J	5.686	729	6.415
	A	4.347	698	5.045
	S	4.563	871	5.434
	O	5.324	675	5.999
	N	5.770	625	6.395
	D	6.632	771	7.403
2017	E	6.692	769	7.461
	F	6.517	1.033	7.550
	M	8.431	1.332	9.763
	A	9.800	775	10.575
	M	10.362	647	11.009
	J	9.011	912	9.923
	J	8.375	1.455	9.830
	A	8.703	750	9.453

	S	7.290	727	8.017
	O	7.962	285	8.247
	N	8.134	506	8.640
	D	9.066	556	9.622
2018	E	11.502	721	12.223
	F	12.955	1.175	14.130
	M	12.314	956	13.270
	A	10.834	1.440	12.274
	M	10.817	1.110	11.927
	J	11.565	700	12.265
	J	9.526	575	10.101
	A	8.192	517	8.709
	S	7.192	915	8.107
	O	7.855	2.416	10.271
	N	8.392	920	9.312
	D	10.625	1.032	11.657
2019	E	16.594	1.097	17.691
	F	14.854	904	15.758
	M	14.990	940	15.930
	A	16.223	453	16.676
	M	14.191	501	14.692
	J	13.456	731	14.187
	J	13.306	805	14.111
	A	10.720	715	11.435
	S	7.987	409	8.396
	O	11.199	sin dato	11.199
	N	12.623	403	13.026
	D	9.924	387	10.311
2020	E	9.519	377	9.896
	F	16.347	261	16.608
	M	14.189	sin dato	14.189
	A	21.123	sin dato	21.123
	M	22.419	1.532	23.951
	J	14.648	2.650	17.298
	J	5.166	6.253	11.419
	A	7.414	263	7.677
	S	8.357	sin dato	8.357
	O	10.709	sin dato	10.709
	N	11.326	402	11.728
	D	11.024	153	11.177
2021	E	9.040	30	9.070
	F	12.096	192	12.288
	M	9.390	1.060	10.450
	A	6.599	1.286	7.885
	J*	1.893	763	2.656
	J	958	1.783	2.741

	J	5.176	414	5.590
	A	905	3.214	4.119
	S	1.479	728	2.207
	O	3.826	857	4.683
	N	4.928	337	5.265
	D	5.794	1.496	7.290
2022	E	7.556	41	7.597
	F	2.508	713	3.221
	M	4.954	37	4.991
	A	3577	695	4.272
	M	2782	381	3.163
	J	440	807	1.247
	J	1.801	1.150	2.951
	A	2.020	427	2.447
	S	2.372	718	3.090
	O	7.969	414	8.383
	N	4.528	366	4.894
	D	4.121	88	4.209
2023	E	5.739	191	5.930
	F	5.831	sin dato	5.831
	M	5.595	sin dato	5.595
	A	5.661	199	5.860
	M	4.882	857	5.739
	J	1.437	325	1.762
	J	1.931	sin dato	1.931
	A	2.120	464	2.584
	S	1.287	327	1.614
	O	1.539	37	1.576
	N	2.071	243	2.314
	D	2.896	sin dato	2.896
2024	E	4.112	46	4.158
	F	4.792	38	4.830
	M	3.198	7	3.205
	A	5.362	31	5.393
	M	2.359	202	2.561
	J	370	1.213	1.583
	J	2.505	49	2.554
	A	1.884	424	2.308
	S	1.075	364	1.439
	O	3.518	181	3.699
	N	2.943	244	3.187
	D	2.603	29	2.632
2025	E	3.530	47	3.577
	F	5.898	3	5.901
	M	4.131	Sin dato	4.131

	A	5.424	sin dato	5.424
	M	1.253	779	2.032
	J	4.544	503	5.047
	J	4.350	49	4.399
	A	3.052	191	3.243
	S	3.096	516	3.612
	O	1.478	447	1.925
	N	3.006	282	3.288
	D	3.018	101	3.119
2026	E	2.329	2	2.331

Anexo 5.3 Resumen abundancias (n°, %) monitoreo enero de 2026 en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo – Sitio Ramsar Carlos Anwandter.

ESPECIE	Abundancia (n.º)	Abundancia (%)
Aguila pescadora	1	0,02%
Bandurria	3	0,07%
Becacina	0	0,00%
Cisne coscoroba	0	0,00%
Cisne cuello negro	2.329	52,22%
Cormorán yeco	81	1,82%
Cuervo del pantano	0	0,00%
Garza boyera	1	0,02%
Garza chica	30	0,67%
Garza cuca	56	1,26%
Garza grande	56	1,26%
Gaviota cáhuil	136	3,05%
Gaviotín piquerito	1	0,02%
Gaviota dominicana	6	0,13%
Huairavillo	1	0,02%
Huairavo	0	0,00%
Huala	101	2,26%
Martín pescador	0	0,00%
Pato anteojillo	0	0,00%
Patos jergones	39	0,87%
Pato negro	0	0,00%
Pato real	1.063	23,83%
Pelicano	0	0,00%
Picurio	2	0,04%
Pidén	3	0,07%
Pimpollo	0	0,00%
Queltehue	184	4,13%
Run Run	8	0,18%
Siete colores	2	0,04%
Taguas	255	5,72%
Tagüita	0	0,00%
Tiuque	7	0,16%
Traro	7	0,16%
Trile	0	0,00%
Zarapito	2	0,04%
Otro: Jotes	16	0,36%
Otro: Golondrina chilena	32	0,72%
Otro: Trabajador	1	0,02%
Otro: Chercán	1	0,02%
Otro: Fío fío	5	0,11%
Otro: Pitotoy grande	1	0,02%
Otro: Loros (indeterminado)	30	0,67%
TOTAL	4.460	100,00%

Anexo 5.4 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo - Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero 2000 – enero 2026.

	n° cisnes de cuello negro												
año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	Promedio
2000	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	5.637
2001	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	4.767
2002	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	5.777
2003	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	5.724
2004	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	5.091
2005	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	553
2006	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	559
2007	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	520
2008	311	214	360	352	726	249	272	252	869	972	1.084	1.376	586
2009	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	379
2010	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	511
2011	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	445
2012	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	1.327
2013	1.699	1.519	1.833	1.430	1.606	1.442	1.898	1.789	1.556	1.897	1.949	2.816	1.786
2014	2.323	3.062	3.524	2.821	3.632	3.426	3.210	3.498	3.369	2.766	2.308	2.958	3.075
2015	2.764	3.121	4.053	3.794	3.692	3.650	4.395	3.598	3.208	3.396	2.151	2.251	3.339
2016	3.820	3.297	5.889	6.815	8.435	6.238	5.686	4.347	4.563	5.324	5.770	6.632	5.568
2017	6.692	6.517	8.431	9.800	10.362	9.011	8.375	8.649	7.290	8.012	8.119	9.066	8.360
2018	11.502	12.955	12.314	10.834	10.817	11.565	9.526	8.192	7.192	7.855	8.392	10.625	10.147
2019	16.594	14.854	14.990	16.223	14.191	13.456	13.306	10.720	7.987	11.199	12.623	9.924	13.006
2020	9.519	16.347	14.189	21.123	22.419	14.648	5.166	7.414	8.357	10.709	11.326	11.024	12.687
2021	9.040	12.096	9.390	6.599	1.893	958	5.176	905	1.479	3.826	4.928	5.794	5.174
2022	7.556	2.508	4.954	3.577	2.782	440	1.801	2.020	2.372	7.969	4.528	4.121	3.719
2023	5.739	5.831	5.595	5.661	4.882	1.437	1.931	2.120	1.287	1.539	2.701	2.896	3.468
2024	4.112	4.792	3.198	5.362	2.359	370	2.505	1.884	1.075	3.518	2.943	2.603	2.893
2025	3.530	5.898	4.131	5.424	1.253	4.544	4.350	3.052	3.096	1.478	3.006	3.018	3.565
2026	2.329												2.329

Anexo 5.5 Inventario de especies presentes en el SN SR basado en la información disponible en los registros de CONAF y complementado con la base de datos de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Fuente: GBIF.org (20 de abril de 2022) Descarga de ocurrencia de GBIF <https://doi.org/10.15468/dl.fpxg9t>. RCE = Reglamento Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente.

Orden	Familia	ESPECIES	Nombre común	RCE
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Peuco	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo polyosoma</i>	Aguilucho común	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Bailarín	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Águila	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus cinereus</i>	Vari ceniciento	
Accipitriformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Jote de cabeza colorada	
Accipitriformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Jote de cabeza negra	
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Cygnus melancoryphus</i>	Cisne de cuello negro	LC
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas flavirostris</i>	Pato jergón chico	
Anseriformes	Anatidae	<i>Mareca sibilatrix</i>	Pato Real	
Anseriformes	Anatidae	<i>Specularis specularis</i>	Pato anteojo	NT
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas georgica</i>	Pato jergón grande	
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato Cuchara	
Anseriformes	Anatidae	<i>Netta peposaca</i>	Pato negro	
Anseriformes	Anatidae	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Cisne coscoroba	LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Sephanoides sephaniodes</i>	Picaflor chico	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Queltehue común	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius falklandicus</i>	Chorlo de doble collar	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius modestus</i>	Chorlo chileno	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna trudeaui</i>	Gaviotín piquerito	
Charadriiformes	Laridae	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Gaviota cáhuil	
Charadriiformes	Laridae	<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota dominicana	
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna hirundinacea</i>	Gaviotín sudamericano	
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus pipixcan</i>	Gaviota de Franklin	LC
Charadriiformes	Laridae	<i>Thalasseus elegans</i>	Gaviotín elegante	NT
Charadriiformes	Laridae	<i>Rynchops niger</i>	Rayador	
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Perrito	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i>	Zarapito común	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Pitotoy grande	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Limosa haemastica</i>	Zarapito de pico recto	
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguayae</i>	Becacina	LC
Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	Pitotoy chico	LC

Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas araucana</i>	Torcaza	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	Tórtola	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Paloma doméstica	
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador	
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	Traro	
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimango</i>	Tiuque	
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo	
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino	LC
Galliformes	Odontophoridae	<i>Callipepla californica</i>	Codorniz	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica armillata</i>	Tagua común	
Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	Pidén común	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica rufifrons</i>	Tagua de frente roja	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica leucoptera</i>	Tagua chica	
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i>	Taguita del norte	
Gruiformes	Rallidae	<i>porphyriops melanops</i>	Taguita común	
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus jamaicensis</i>	Pidencito	EN (XV-III), NT (IV-XII)
Passeriformes	Cotingidae	<i>Phytotoma rara</i>	Rara	
Passeriformes	Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chincol	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus barbatus</i>	Jilguero austral	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes patagonicus</i>	Churrete patagónico	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Phleocryptes melanops</i>	Trabajador	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Aphrastura spinicauda</i>	Rayadito	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Sylviorthorhynchus desmursii</i>	Colilarga	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Pygarrhichas albogularis</i>	Comesebo grande	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Leptasthenura aegithaloides</i>	Tijeral común	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucopyga</i>	Golondrina chilena	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina bermeja	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina de dorso negro	
Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Golondrina barranquera	
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	Mirlo común	
Passeriformes	Icteridae	<i>Agelasticus thilius</i>	Trile	
Passeriformes	Icteridae	<i>Curaeus curaeus</i>	Tordo	
Passeriformes	Icteridae	<i>Sturnella loyca</i>	Loica	
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus thenca</i>	Tenca chilena	
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus correndera</i>	Bailarín chico común	
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scelorchilus rubecula</i>	Chucazo	LC
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus magellanicus</i>	Churrín del sur	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Eugralla paradoxa</i>	Churrín de la mocha	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Pterotochos tarnii</i>	Hued-hued del sur	LC
Passeriformes	Thraupidae	<i>Phrygilus patagonicus</i>	Cometocino patagónico	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	Chirihue común	

Passeriformes	Thraupidae	<i>Diuca diuca</i>	Diuca común	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Chercán común	
Passeriformes	Troglodytidae	<i>Cistothorus platensis</i>	Chercán de las vegas	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus falcklandii</i>	Zorzal patagónico	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia albiceps</i>	Fío-fío	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis pyrope</i>	Diucón	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tachuris rubrigastra</i>	Siete colores	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Anairetes parulus</i>	Cachudito común	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hymenops perspicillatus</i>	Run-run	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colorhamphus parvirostris</i>	Viudita	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscisaxicola maclovianus</i>	Dormilona tontita	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	Garza cuca	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza grande	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Garza chica	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus involucris</i>	Huairavillo común	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Huairavo común	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garza bueyera	
Pelecaniformes	Pelecanidae	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelícano de Humboldt	NT
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus melanopis</i>	Bandurria común	LC
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	Cuervo de pantano común	NT
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes pitius</i>	Pitio austral	
Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis lignarius</i>	Carpinterito	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps major</i>	Huala	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	Pimpollo común	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Picurio	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps occipitalis</i>	Blanquillo	
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Enicognathus leptorhynchus</i>	Choroy	LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Enicognathus ferrugineus</i>	Cachaña	
Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium nana</i>	Chuncho austral	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Yeco	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax gaimardi</i>	Lile	NT
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Leucocarbo atriceps</i>	Cormorán imperial	

LC = Preocupación menor

NT = Cercano a la amenaza

EN = En peligro



Santuario de la Naturaleza
Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Carlos Anwandter

www.parqueslosrios.cl



<https://www.ramsar.org/es>